Modes d'action des classes de médicaments antihyperglycémiant

Biguanides

Metformine (Glucophage^{MD}, Glumetza^{MD})

- Diminuent la quantité de sucre produite par le foie ;
- Aident les cellules du corps à utiliser le sucre de manière plus efficace.

Cellules

Foie

TZD

Pioglitazone (Actos^{MD})
Rosiglitazone (Avandia^{MD})

- Aident les cellules du corps à utiliser le sucre de manière plus efficace.

Reins

Inhibiteurs du SGLT2

Canagliflozine (Invokana^{MD})
Empagliflozine (Jardiance^{MD})
Dapagliflozine (Forxiga^{MD})

- Favorisent l'élimination du sucre dans l'urine.

Inhibiteurs de la DPP-4

Linagliptine (Trajenta^{MD}), Saxagliptine (Onglyza^{MD}), Sitagliptine (Januvia^{MD}), Alogliptine (Nesina^{MD})

- Augmentent l'effet de certaines hormones intestinales (incrétines) qui agissent lorsque la glycémie s'élève après un repas : augmentent la production d'insuline et diminuent la production de glucagon par le pancréas.

Inhibiteur des alpha-glucosidases

Acarbose (Glucobay^{MD})

- Ralentit la digestion de certains glucides (sucres) dans les intestins.

Sécrétagogues de l'insuline

Médicaments qui mettent à risque d'hypoglycémie

Gliclazide (Diamicon^{MD})
Gliclazide (Diamicon^{MD} MR)
Glimépiride (Amaryl^{MD})
Glyburide (DiaBeta^{MD})
Répaglinide (GlucoNorm^{MD})

- Augmentent la production d'insuline par le pancréas.

Intestins

Pancréas

Agonistes du GLP-1

Médicaments injectables

Liraglutide (Victoza^{MD})
Dulaglutide (Trulicity^{MD})
Semaglutide (Ozempic^{MD})

Médicaments oral

Semaglutide (Rybelsus^{MD})

Agoniste du GIP et GLP-1

Tirzépatide (Mounjaro^{MD})

- Ralentissent la digestion dans l'estomac ;
- Diminuent l'appétit ;
- Imitent certaines hormones intestinales (incrétines) qui agissent lorsque la glycémie est élevée : augmentent la production d'insuline et diminuent la production de glucagon par le pancréas.