الموارد

Ordre des pharmaciens du Québec
نقابة الصيادلة في كيبك
opq.org

بعض التوصيات

للإستفادة من جميع منافع أدويتك، إليك بعض التوصيات:

- التزم بتعليمات تناول الأدوية، بما في ذلك الجرعة، والتكرار، ووقت تناولها. وإذا كنت تنسى تناول أدويتك، اطلب من فريق الرعاية الصحية إمدادك بنصائح عملية؛
- تحقّق من مستوى السكر بالدم وفقاً لتوصيات فريق الرعاية الصحية؛
- في حال حدوث آثار جانبية، استشر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك لمعرفة الإجراءات التي يجب اتخاذها؛
- احرص دائماً على أن تكون معك قائمة محدّثة (روشتة أو وصفة مجدّدة) بجميع أدويتك.

بالنسبة لأيّ سؤال يتعلّق بدوائك، لا تتردّد في استشارة الصيدلي (الخاص بك) أو استشارة طبيبك.

L'école du diabète

Universi D

universi-d.com

Diabète Québec
diabete.qc.ca

Diabète Québec

دواء لعلاج السّكري

آليات عمل فئات الأدوية المضادة لارتفاع السكر في الدم

دواء لعلاج السكري

يمكن أن يتم وصف أدوية للسكري لك إذا لم ينجح أسلوب اتخاذ عادات الحياة الصحية في الحفاظ على مستوى سكر الدم (نسبة السكر في الدم) ضمن القيم المستهدفة. وقد توصف لك هذه الأدوية منذ البداية إذا كانت نسبة سكر الدم لديك مرتفعة للغاية أثناء التشخيص.

وتعمل الأدوية المضادة للسكري، والتي تُعرف بإسم **مضادات ارتفاع سكر الدم، على تقليل مستويات السكر المرتفعة جداً في الدم.** ويمكن أن تُؤخذ على شكل أقراص أو حقن.

ومن المهم جداً أن تكون الأدوية مُرفقة (مصحوبة) ببرنامج غذائي ونشاط بدني.

وتقوم جميع هذه الجوانب بدور هام في إدارة مستوى سكر الدم لديك.

فمُ باستكشاف وظائف كل دواء وتأثيره على جسمك من خلال الإطلاع على الرسم التوضيحي المقابل.

إدارة مرض السكري لديك تعتمد عليك!

من الضروري أن تتناول أدويةك حسب الوصفة الطبية وأن تقوم بمناقشة أيّ تعديلات مُحتملة مع الصيدلي الخاص بك أو طبيبك.

البيغوانيدات (خافضات السكر في الدم): الميتفورمين (غلوكوفاج غلوميتر، Glucophage^{MD}), (Glumetza^{MD})

- تُقلل كمية السكر التي ينتجها الكبد؛
- تُساعد الخلايا على امتصاص السكر بشكل أكثر فعالية.

الكبد

الخلايا

TZD بيوغليتازون (Actos^{MD}) روزيجليتازون (Avandia^{MD})

- تُساعد خلايا الجسم على استخدام السكر بطريقة أكثر فعالية.

الكلية

محفّزات SGLT2 كاناغلفلوزين (Invokana^{MD}) امباغلفلوزين (Jardiance^{MD}) داباغلفلوزين (Forxiga^{MD})

- تُعزّز التخلص من السكر عن طريق البول.

محفّزات DPP-4

ليناغليبتين (Trajenta^{MD})، ساكساغليبتين (Onglyza^{MD})،
سيتاغليبتين (Januvia^{MD})، ألوغليبتين (Nesina^{MD})

- تُزيد من تأثير بعض الهرمونات المعوية (الإنكريتين) التي تعمل عندما يرتفع مستوى السكر في الدم بعد الوجبة: تُزيد من إنتاج الأنسولين وتقلل من إنتاج الجلوكاغون بواسطة البنكرياس.

مثبطات (تخفيض السكر) ألفا-غلوكوزيداز-أكاربوز (Glucobay^{MD})

- تُبطئ عملية هضم بعض الكربوهيدرات (السكريّات) في الأمعاء

الأمعاء

محفّزات إفراز الأنسولين

أدوية تُعرض لخطر انخفاض مستوى السكر في الدم:
غليكلازيد (Diamicron^{MD})
غليبيزيد (Amaryl^{MD})
غليبيزيد (DiaBeta^{MD})
ريبأغلينديد (GlucNorm^{MD})

- تُزيد من إنتاج الأنسولين بواسطة البنكرياس.

البنكرياس

محفّزات GLP-1

أدوية تُؤخذ عن طريق الحقن:

ليراغلوتيب (Victoza^{MD})
دولاغلوتيب (Trulicity^{MD})
سيماغلوتيب (Ozempic^{MD}) (Ozempic^{MD})

أدوية تُؤخذ عن طريق الفم
سيماغلوتيب (Rybelsus^{MD})

محفّزات GLP-1 و GIP تيرزيايب (Mounjaro^{MD})

- تُبطئ عملية الهضم في المعدة؛
- تُقلل من الشهية؛
- تُحاي بعض الهرمونات المعوية

(الإينكريتين) التي تعمل عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعاً: تُزيد من إنتاج الأنسولين وتقلل من إنتاج الجلوكاغون بواسطة البنكرياس.